100408914 | Rev:4
Released: 29 Jun 2021
CO: 100870631
Release Level: 4. Production

Gebrauchsanweisung de

VICRYL™
POLYGLACTIN 910
STERILES SYNTHETISCH RESORBIERBARES CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL

BESCHREIBUNG
VICRYL™ Nahtmaterial ist ein steriles, synthetisches, resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial. Es besteht aus einem Copolymer aus 90 % Glykolid und 10 % L-Lactid. Das Copolymer hat die Summenformel $(C_2H_2O_2)_x(C_3H_4O_2)_y$. VICRYL™ Nahtmaterial ist geflochten und beschichtet als auch unbeschichtet erhältlich.

VICRYL™ Nahtmaterial ist mit einer Mischung beschichtet, die zu gleichen Teilen aus einem Copolymer von Glykolid und Lactid (Polyglactide 370) und Calciumstearat besteht. Copolymer Polyglactide 910 und Polyglycolsäure (Polyglycolide) sind in organischen Lösungsmitteln nicht artigen und nicht porogen und rufen während der Resorption nur eine leichte Gewebereaktion hervor.

VICRYL™ Nahtmaterial ist sowohl ungefärbt als auch gefärbt mit D&C Violet Nr. 2 (Farbindex 60725) erhältlich. Der gefärbte Faden erleichtert das Handhaben.

VICRYL™ Nahtmaterial steht in verschiedenen Typen, Stärken und Längen, wahlweise ohne Nadeln oder mit Nadeln verschiedener Typen und Geometrien, wie Weitere Informationen erhältlich.

VICRYL™ Nahtmaterial entspricht den Anforderungen der Europäischen Arzneibuch (Ph. Eur.) für steriles synthetisches resorbierbares geflochtenes Nahtmaterial und den United States Pharmacopeia (USP) für resorbierbares geflochtenes Nahtmaterial. Ausnahme einer Incision (Beispiele für den mehrfachen Messgriffe ist, folgende Tabelle).

USP Größenbezeichnung	Größenbezeichnung des Nahtmaterials	Durchschnittliche Fadendurchmesser in Millimetern
9–0 (nur unbeschichtetes Nahtmaterial)	0,3	0,005 mm
6–0	0,7	0,008 mm
5–0	1	0,016 mm
4–0	1,5	0,017 mm
3–0	2	0,018 mm
2–0	3	0,004 mm
0	5,5	0,022 mm

Europa Pharmakopöe Tonnesch mnetemnsfäuchtiku ühikuid ja. Ta ei soovita vähelnna nno ge kajastub ta pakend mängitsust.

NÄIDUSTUSED
VICRYL™ Nahtmaterial on näidustatud ühtlustu pehmete kudede lähendamiseks ja/ või kõpertmiseks, sealhulgas silmaoperatsioonidel, perifeerse närvide anastomoosiks ja ainus z.nnn lähendamiseks pehmete kudede korral. VICRYL™ Ambulatoorsel ohutusel ja efektiivsel kasutamisel sõdame vennosonnkuna kuuldel ei ole kindlaks leitud.

Istruzioni per l'uso it

VICRYL™
POLYGLACTIN 910
SUTURA CHIRURGICA STERILE ASSORBIBILE STERILE

DESCRIZIONE
La sutura VICRYL™ è una sutura chirurgica sintetica assorbibile sterile, in copolimero composto al 90 % da glicolide e al 10 % da L-lattide. La formula empirica del copolimero è $(C_2H_2O_2)_x(C_3H_4O_2)_y$. La sutura VICRYL™ è disponibile sia rivestita che non rivestita.

La sutura VICRYL™ è rivestita con una miscela composta in parti uguali da un copolimero di glicolide e lattide (Polyglactide 370) e stearato di calcio. I copolimeri Polyglactide 910 e Polyglactide 370 con stearato di calcio si sono dimostrati non antigenici, aporogeni e provocano solo una lieve reazione tissutale durante il processo di assorbimento.

La sutura VICRYL™ è disponibile non colorata e colorata con D&C Violet #2 (C.I. n. 60725) per migliorarne la visibilità in campo chirurgico.

La sutura VICRYL™ è disponibile in diversi calibri e lunghezze, tipi e misure, senza ago o applicata ad aghi di diversi tipo e misura, come descritto nella sezione FORMA DI FORNITURA.

La sutura VICRYL™ è conforme ai requisiti della Farmacopea Europea (Ph. Eur.) per le suture intrecciate assorbibili sintetiche sterili e alla Farmacopea degli Stati Uniti (USP) per le suture chirurgiche assorbibili, eccetto che per un leggero sovradimensionamento di alcune misure in gauge, come mostrato nella seguente tabella.

Designazione USP misura suture	Designazione metrica misura suture	Sovradimensionamento
9–0 (solo intrecciata senza rivestimento)	0,3	0,005 mm
6–0	0,7	0,008 mm
5–0	1	0,016 mm
4–0	1,5	0,017 mm
3–0	2	0,018 mm
2–0	3	0,004 mm
0	5,5	0,022 mm

La Farmacopea Europea riconosce le unità di misura metriche e le misure Ph. Eur. come equivalenti, come indicato sull'etichetta.

INDICAZIONI
La sutura VICRYL™ è indicata per approssimazioni e/o legature generali dei tessuti molli, compresi interventi di chirurgia oftalmica, anastomosi dei nervi periferici e microchirurgia dei vasi sanguigni di diametro inferiore a 2 mm. La sicurezza e l'efficacia della sutura VICRYL™ nel trattamento cardiovascolare non sono ancora state stabilite.

Instructions for use en

VICRYL™
POLYGLACTIN 910
STERILE SYNTHETIC ABSORBABLE SURGICAL SUTURE

DESCRIPTION
VICRYL™ Suture is a sterile, synthetic, absorbable, surgical suture composed of a copolymer made of 90% glycolide and 10% L-lactide. The empirical formula of the copolymer is $(C_2H_2O_2)_x(C_3H_4O_2)_y$. VICRYL™ Suture is available as a coated or uncoated suture.

VICRYL™ Suture is coated with a mixture composed of equal parts of copolymer of glycolide and lactide (Polyglactide 370) and calcium stearate. Polyglactide 910 copolymer and Polyglactide 370 with calcium stearate have been found to be nonantigenic, aporogenic and produce only a slight tissue reaction during absorption.

VICRYL™ Suture is available undyed and dyed with D&C Violet #2 (Color Index 60725) to improve its visibility in the surgical field.

VICRYL™ Suture is available in a range of gauge sizes and lengths, types and sizes, and presentations non-needled or attached to various types and geometries of needles as described in the HOW SUPPLIED section.

VICRYL™ Suture complies with the requirements of the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) for Sterile Synthetic Absorbable Braided Sutures and United States Pharmacopoeia (USP) for Absorbable Surgical Suture, except for a slight oversize in some gauges as shown in the table below.

USP Suture Size	Metric Suture Size	Maximum Oversize
9–0 (uncoated braid only)	0,3	0,005 mm
6–0	0,7	0,008 mm
5–0	1	0,016 mm
4–0	1,5	0,017 mm
3–0	2	0,018 mm
2–0	3	0,004 mm
0	3,5	0,022 mm

The European Pharmacopoeia recognizes units of measure Metric and Ph. Eur. Sizes as equivalent, which is indicated on the label.

INDICATIONS
VICRYL™ Suture is indicated for use in general soft tissue approximation and/or ligation, including use in ophthalmic surgery, peripheral nerve anastomosis and microsurgery for vessels less than 2 mm diameter. The safety and effectiveness of VICRYL™ Suture in cardiovascular surgery have not been established.

APPLICATIONS
VICRYL™ Suture is selected and implanted depending on patient condition, surgical experience, surgical technique and wound size.

Návod k použití cs

VICRYL™
STERILNÍ SYNTETICKÝ VSTŘEBATELNÝ CHIRURGICKÝ ŠICÍ MATERIÁL
VICRYL™
POLYGLACTIN 910

POPIS
Šicí materiál VICRYL™ je sterilní syntetický vstřebatelný chirurgický šicí materiál tvořený kopolymerem obsahujícím 90 % glykolidu a 10 % L-lactidu. Empirický vzorec kopolymeru je $(C_2H_2O_2)_x(C_3H_4O_2)_y$. Šicí materiál VICRYL™ je k dispozici jako potahovaný nebo nepotahovaný šicí materiál.

Šicí materiál VICRYL™ je potahový směsí složenou ze stejného dílu polyglactidu 370 (kopolymeru glykolidu a lactidu) a kalcium-stearátu. Bylo zjištěno, že kopolymer polyglactidu 910 a polyglactidu 370 s kalcium-stearátem jsou neantigenní, aporogenní a při vstřebávání vyvolávají pouze mírnou reakci tkání.

Šicí materiál VICRYL™ je k dispozici nebarvený nebo barvený fialovým barvivem D&C Violet 2. (barvivo číslo barvy 60725) ke zlepšení viditelnosti v chirurgickém poli.

Šicí materiál VICRYL™ je k dispozici v široké řadě průměrů a délek, typů a velikostí a v provedeních bez jehly nebo s jehlami různých typů a velikostí, jak je popsáno v kapitole PŘÍPRAVEK DODÁVKY.

Šicí materiál VICRYL™ splňuje požadavky Evropského lékopisu (Ph. Eur.) pro sterilní syntetické vstřebatelné splétané šicí materiály a Lékopisu Spojených států amerických (USP) pro vstřebatelné chirurgické šicí materiály s výjimkou malého přesahu v některých průměrech, jak je uvedeno v následující tabulce.

Velikost šicího materiálu dle USP	Metrická velikost šicího materiálu	Maximální přesah
9–0 (pouze neopletená vyšívací nitěná)	0,3	0,005 mm
6–0	0,7	0,008 mm
5–0	1	0,016 mm
4–0	1,5	0,017 mm
3–0	2	0,018 mm
2–0	3	0,004 mm
0	3,5	0,022 mm

Evropská lékařská farmakopea uznává jednotky měření a velikosti Ph. Eur. jako ekvivalentní, což je vyznačeno na štítku.

INDIKACE
Šicí materiál VICRYL™ je určen k použití pro obecné přibližování a/nebo řízení měkkých tkání, včetně použití v oftalmologii, při anastomóze periferních nervů a při malých cévách o průměru menším než 2 mm. Bezpečnost a účinnost šicího materiálu VICRYL™ v kardiovaskulární chirurgii nebyly dosud stanoveny.

Brugsanvisning da

VICRYL™
POLYGLACTIN 910
STERIL SYNTETISK RESORBERBAR KIRURGISK SUTUR

BESKRIVELSE
VICRYL™ sutur er en steril, syntetisk, resorberbar kirurgisk sutur bestående af en copolymer, der er fremstillet af 90 % glykolid og 10 % L-lactid. Copolymerens empiriske formel er $(C_2H_2O_2)_x(C_3H_4O_2)_y$. VICRYL™ sutur fås som coated eller ikke-coated sutur.

VICRYL™ sutur er coated med en blanding bestående af lige dele copolymer af glykolid og lactid (polyglactin 370) og calciumstearat. Polyglactin 910 copolymer og polyglactin 370 med calciumstearat har vist sig at være ikke-antigene og ikke-porøse, og de producerer kun en let vævsreaktion under resorption.

VICRYL™ sutur fås ufærvet og farvet med D&C violet nr. 2 (farvedetektor: 60725) for at forbedre synligheden i det kirurgiske felt.

ADVARSLER
VICRYL™ sutur er ikke bekræftet med kirurgiske produkter og trikinlider, der involverer resorberbare suturer, der er fremstillet af VICRYL™ sutur til sikkerhed, da risikoen for skimpler kan øges efter applikationen af produkterne. Det anbefaler anvendelsen af VICRYL™ sutur kun af læger bare hvor de er i stue-pårørende (se afsnitet FORÆVNE/FORHÅNDSREGLER).

Forøvrig kan kontraindikationer eller advarsler ud over dem, der er beskrevet i dette afsnit, ikke gælder.

NÆTANVENDELSE
Vedlæsnet sikkerhed sygemed i en dermapæske farmakologisk (USP) for resorberbare kirurgiske suturer, som er i det danske markedsføring. Det er i det danske markedsføring.

STERILITET
VICRYL™ sutur er steriliseret med ethylenoxidgas. Ikke ikke-resterbarere. Ikke ikke anvendes, hvis pakningen er åben eller beskadiget. Åbne, ubrugte suturer skal kasseres.

OPBEVARING
Denne anordning kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaring. Ikke ikke levner, eller at holdbarhedsdatoen er overskredet.

ETIKETTER
Bemærk venligst, at ikke alle suturer er tilgængelige på alle markeder. Kontakt den lokale forhandler vedrørende tilgængelighed af produkterne.

VICRYL™ sutur fås som sterile tråde i størrelse 10–0 til og med 6 (metrisk størrelse 0,3 og 0,2–0,8), i en række længder, med eller uden permanent jåbale nål.

VICRYL™ sutur fås også som monofilament i størrelse 9–0 og 10–0 (metrisk størrelse 0,3 og 0,2).

VICRYL™ sutur fås også som sterile tråde med jåbale i CONTROL RELEASE™-fæmbæner nåle, ethylenoxid, bestået af tråde med en lille diameter.

VICRYL™ sutur fås i æsker a ét, to eller tre dosin enheder.

Instrucciones de uso es

VICRYL™
POLIGLACTINA 910
SUTURA QUIRÚRGICA ESTERIL SINTÉTICA ABSORBIBLE

DESCRIPCIÓN
La sutura quirúrgica **VICRYL™** es estéril, sintética y absorbible y está compuesta de un copolímero formado en un 90 % de glicolida y 10 % de L-láctido. La fórmula empírica del copolímero es $(C_2H_2O_2)_x(C_3H_4O_2)_y$. La sutura VICRYL™ está disponible como sutura recubierta o sin recubrimiento.

La sutura VICRYL™ está recubierta de una mezcla a partes iguales de copolímero de glicolida y lactida (Polyglactina 370) y estearato de calcio. Los copolímeros de polyglactina 910 y polyglactina 370 con estearato de calcio no son antigénicos, aporogenos y producen solo una leve reacción tisular durante el proceso de absorción.

La sutura VICRYL™ está disponible en color natural y teñida con D&C Violet #2 (C.I. n. 60725) para mejorar su visibilidad en el campo quirúrgico.

La sutura VICRYL™ está disponible en diversos calibres y longitudes, tipos y medidas, sin aguja o aplicada a agujas de diversos tipo e medida, como describe nella sezione FORMA DI FORNITURA.

La sutura VICRYL™ se conforma ai requisiti della Farmacopea Europea (Ph. Eur.) per le suture intrecciate assorbibili sintetiche sterili e alla Farmacopea degli Stati Uniti (USP) per le suture chirurgiche assorbibili, eccetto che per un leggero sovradimensionamento di alcune misure in gauge, come mostrato nella seguente tabella.

Designazione USP misura suture	Designazione metrica misura suture	Sovradimensionamento
9–0 (solo intrecciata senza rivestimento)	0,3	0,005 mm
6–0	0,7	0,008 mm
5–0	1	0,016 mm
4–0	1,5	0,017 mm
3–0	2	0,018 mm
2–0	3	0,004 mm
0	5,5	0,022 mm

La Farmacopea Europea riconosce le unità di misura metriche e le misure Ph. Eur. come equivalenti, come indicato sull'etichetta.

INDICACIONES
La sutura VICRYL™ está indicada para aproximaciones y/o ligaduras general del tejido molli, compresi interventi di chirurgia oftalmica, anastomosi dei nervi periferici e microchirurgia dei vasi sanguigni di diametro inferiore a 2 mm. La sicurezza e l'efficacia della sutura VICRYL™ nel trattamento cardiovascolare non sono ancora state stabilite.

Kasutusjuhised et

VICRYL™
POLÜGLAKTIIN 910
STERILNE SÜNTETILINE RESORBEERUVAD KIRURGILINE ÕMBLUSMATERJAL

KIRJELDUS
VICRYL™ õmblusmaterjal on steriilne süntetiline resorbeerivad kirurgiline õmblusmaterjal, mis koosneb 90 % glükolüüdi ja 10 % L-laktiidi sisaldavast kopolüümerist. Kopolüümeri empiirne valem on $(C_2H_2O_2)_x(C_3H_4O_2)_y$. VICRYL™ õmblusmaterjal on saadaval kas kattega ja kattega õmblusmaterjalina.

VICRYL™ õmblusmaterjal on kaetud glükolüüdi ja laktiidi (polüglaktiin 370) kopolüümeri ja kaltsiumstearaadi segusega. Kopolüümeri polüglaktiin 910 ja polüglaktiin 370 kaltsiumstearaadiga haaramine võib polüglaktiini paranoidsed või mustamist. Nõelte kujunemistul võivad tekeerd kaotsi tõsiseks ja ei ole kõrvaltoime ja ei ole kõrvaltoime ja ei ole kõrvaltoime.

Kvastajad pseudovõrgete niiskete kõsterrooli olenev ettevaatlikult, et vältida tahtmatud nõlvadeesseisjaid. VICRYL™ õmblusmaterjal ei ole mõeldud kasutamiseks kõrvaltoime võiva operatsioonil vajaliku võivõrka jäänine organism. Tõlmetud nõelatõrkeõsegaid ei ole kõrvaltoime. Ainult kõrvaltoime ei ole kõrvaltoime ei ole kõrvaltoime ei ole kõrvaltoime. Kasutatud nõelad tuleb visata levate esemete mahutisse.

KÕRVALTOIME
Seadme kasutamisega seotud kõrvaltoimete hulka kuuluvad haava ebitsemis, kookrenemide moodustumine kuu- või saptredes jõuakõõlsusest tõrge, ebatõsine ja/või ulgu, mõõdus pärtitõlune konnatõsisus jõe rõõdusest kõlulit jõrtsu haava pehmenemis.

STERILISIS
VICRYL™ õmblusmaterjal on steriliseeritud etseenoksiidigaasiga. Mitte resterdatud. Mitte kasutada, kui pakend on avatud või kahjustatud. Võuke ära pakendist võiga võetud. Ikaid kasutamata õmblusmaterjal.

HOIUSTAMINE
See toode ei vaja säilitamist erilisangu. Mitte kasutada pärast aegumiskuupäeva.

TÄRKNIMED
Pange tähele, et kõik suurused ei pruugi kõigil turgudel saadaval olla. Saadavaloleva suuruse kohta teate suunduv müüja kohalikult müügiesindajalt.

VICRYL™ õmblusmaterjal on saadaval erinevas pikkustes ja suurustes suurustes 10–0 kuni 6 (meetermõõdustus 0,2–0,8) nõelaga ja ilma pisimil kinnitatud nõelteta.

VICRYL™ õmblusmaterjal on saadaval ka ühekõõnsus suurustes 9–0 ja 10–0 (meetermõõdustus 0,3 ja 0,2).

VICRYL™ õmblusmaterjal on saadaval ka steriilsete kiududena, mis on kinnitatud CONTROL RELEASE™ eemaldatavate nõelteta, mis võimaldavad nõela lõikamist ainult ühe korra.

VICRYL™ õmblusmaterjal on saadaval pakendites 1 x 12, 2 x 12 või 3 x 12 seadet ühes karbis.

Käyttöohjeet fi

VICRYL™
POLYGLAKTIIN 910
STERILI SYNTETTINEN RESORBOITUVA KIRURGINEN OMMELLANGA

KUVAUS
VICRYL™ -ommelanga on steriili, synteettinen, resorboituva kirurginen ommelanga, joka on valmistettu 90 %:ssa glykolidista ja 10 %:n L-laktidista koostuvasta kopolymeerista. Kopolymeerin empiirinen kaava on $(C_2H_2O_2)_x(C_3H_4O_2)_y$. VICRYL™ -ommelanga on saatavana päällystettyä tai päällystämätöntä.

VICRYL™ -ommelanga on päällystetty yhtä osan määrän glykolidin ja laktidin muodostamaa kopolymeeria (polyglaktiini 370) ja kalsiumstearaatia sisältävällä seoksella. Polyglaktiini 910 -kopolymeerin ja polyglaktiini 370:n kalsiumstearaatin yhdistelmän on todettu olevan antigeenistä, pyrogeenistä, ja se aiheuttaa vain lievän kudosreaktion imeytymisen aikana.

VICRYL™ -ommelanga on saatavana luonnonvärisenä ja sävytettynä D&C Violet no. 2 (väri-indeksi 60725) -ainetta käyttäen, jotta paremmin näkyisi kirurgisen toimenpiteen aikana.

VICRYL™ -ommelanga on saatavana eri koissa, pituuksina, eri tyyppeinä ja koissa, sekä neulattomina tai eri tyyppisillä ja -koilla neuloilla kiinnitettynä, kuten kohdassa TOIMITUSTAPA on kuvattu.

VICRYL™ -ommelanga täyttää Euroopan farmakopean (Ph. Eur.) steriilejä synteettisiä resorboituvia punottuja ommelaineille asettamat vaatimukset ja Yhdysvaltojen farmakopean (USP) resorboituvia punottuja kirurgisia ommelaineita koskevat vaatimukset lukuunottamatta vähäistä ylimittaista joissakin läpimitoissa alla olevan taulukon mukaisesti.

Ommelaineen USP-koko	Ommelaineen metrikoko	Ylimittaus enintään
9–0 (vain päällystämätön punos)	0,3	0,005 mm
6–0	0,7	0,008 mm
5–0	1	0,016 mm
4–0	1,5	0,017 mm
3–0	2	0,018 mm
2–0	3	0,004 mm
0	3,5	0,022 mm

Eurooppalaisen farmakopean mukaan ja Yhdysvaltojen farmakopean mukaan ja ovat samaa ja ovat samaa ja ovat samaa

Naudojimo instrukcija

VICRYL™
POLYGLACTIN 910
STERILIŲ SINTETINIAI ABSORBUOJAMI CHIRURGINIAI SIŪLAI

APRAŠYMAS
VICRYL™ siūlai yra sterilios sintetiniai absorbuojamai chirurginiai siūlai, sudarytų iš kopolimero, kuris paduotas iš 90 % glikolido ir 10 % L-laktido. Empirine kopolimero formulė yra $(C_2H_2O_2)_x(C_3H_4O_2)_y$. VICRYL™ siūlai turėtų paderėjęs ir neapdengti.
VICRYL™ siūlai padengti mišiniu, sudarytu iš lygių glikolido ir laktido (poliglaktine 370) kopolimero dalių ir kalcio stearato. Poliglaktine 910 kopolimeras ir poliglaktine 370 su kalcio stearatu yra neapdengiti ir neporaminėmis bei absorbcijos metu saulės šta neįtinka antibiotikų veikla.
VICRYL™ siūlai tekinami nedydžiu ir dydžiu DBC viešto Nr. 2 (spalvos indekso 60725), kad pagerintų jų matomumą operacinėmis sąlygomis.
VICRYL™ siūlai tiekiami juodai violetinės dažyto ir ilgio sportmetinis, tipo ir dydžio bei be adatos ar su adatos tipo ir dydžio adatomis, kaip aprašyta pagal VICRYL™ SERIJĄ.
VICRYL™ siūlai atitinka Europos Farmakopėjos (Ph. Eur.) reikalavimus sterilumo atžvilgiu. Sterilizuojamieji gamybos metodai bei kontrolės bandymai atitinkamai Europos Farmakopėjos chirurginiams siūlams („Siūlas nejamiesiems kai kurių dydžių mažesniu skersmeniu siūlas, kuris paprastai yra ir vienas iš siūlo elementas sudėtyje“ 2 skyrius) ir yra eksploatacinės savybės (Dr. Wyndham Hansen, „Siūlai“, VIENINAS / VERSINAS).

Užtikrina aria infektuotas žaizdas reikia tvarkyti vadovaujantis priimtina chirurgine praktika.
Kadangi tai yra absorbuojamas medžiaga chirurgas turi apsisaugoti papildomo nuskausmojimo siūlų naudojimo sisuvei vietas, kuriai galėjo, be kitapat atsira kurems gali reikėti papildomo gydymo.
Siūlai yra sterilizuoti / naudoti pakartotinai. Pakartotinai naudojant jį (šiuta (arba be dažo), gali kilti rizika, kad galėjo pasireikšti problemos, tarp jos sterilizacijos ar naudojimo. Pakartotinai naudojant jį (šiuta (arba be dažo) gali kilti rizika, kad galėjo pasireikšti problemos, tarp jos sterilizacijos ar naudojimo. Kadangi yra absorbuojami, tie siūlai taikoje gali dėvėti prieš kelias savaites. Kaip ir visi sertifikatai, čia gamintojas gali pakaitinti infekcją.

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI
Europos Farmakopėja pripažista metrinius matavimo vienetus ir Ph. Eur. dydžius kaip atitinkančią, bet aspiedel ekvivalentą.

INDIKACIJOS
VICRYL™ siūlai skirti naudoti suartinti minkštiesiems audiniams ir (arba) pernešti kraujagysles, jungiamąjį ir nuodegines arba sporadinius audinius, taip pat kai reikalingas ilgesnis laikas, anastomozei perdėtinai nerasa ir nikoniuchirurgijos siūlams (arba nesaikingai) ir nikoniuchirurgijai, ir odineniems dėl nagų ir (ir odinių) minkštųjų ir ilgesnio laikotarpio (maždaug 2 savaičių) ir ilgesnio laikotarpio (maždaug 2 savaičių) ir ir (arba) ir ir (arba) ir ir (arba