



# GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**PESSARY  
PESSARIO  
PESSAIRE  
PESSAR  
PESSARIO  
PESSÁRIO  
ΠΕΣΣΟΣ  
ΠΕΣΑΡ  
PESAR**

**PESAR  
NIJE STERILNO  
PESSZÁRIUM  
PEŠÁRIJS  
PESSARIUM  
PESSAR  
PESAR VAGINAL  
PESAR**

فَرْزَجَة

**GIMA 30030 - 30031 - 30032 - 30033 - 30034 - 30035 - 30036 -  
30037 30038 30039 - 30040 - 30041 - 30042 - 30044 - 30045 - 30046  
30047 30048 - 30049 - 30053 - 30054 - 30055 - 30056 - 30057 -  
30071 - 30072 - 30073 - 30074 - 30075 - 30043**



**Guangzhou Fame Medical Co., Ltd.**

Second Floor a No.8, Lianhua Port Industrial Zone, Lotus Mountain  
Bonded Area, Shilou Panyu District, 511440 Guangzhou China  
Made in China



**REF** PER00 - PER01 - PER02 - PER03 - PER04 - PER05 - PER06 - PER07 - PER08  
PER09 - PERS00 - PERS01 - PERS02 - PERS04 - PERS05 - PERS06 - PERS07  
PERS08 - PERS09 - PEGLO3 - PEGLO4 - PEGLO5 - PEGLO6 - PEGLO7  
PECUD00 - PECUD01 - PECUD02 - PECUD03 - PECUD04 - PERSO3



**SH** **Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



**Gima S.p.A**

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (Mi) - Italy  
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com  
www.gimaitaly.com

## Istruzioni per l'uso

Il pessario flessibile in silicone è utilizzato comunemente in caso di prolasso uterino lieve di primo o secondo grado o di prociidenza. I pessari sono realizzati al %100 in silicone per uso medico. I pessari sono progettati per l'uso su una singola paziente.

### ATTENZIONE

La normativa nazionale prevede che il dispositivo sia prescritto da un medico.

### CONTROINDICAZIONI

I pessari sono controindicati in caso di infezioni acute del tratto genitale, infezioni pelviche o pazienti non collaboranti.

### PROCEDURE

L'individuazione di un pessario della dimensione adatta richiede solitamente una prova delle varie dimensioni disponibili. Il Set di pessari di prova è un valido ausilio alla scelta del pessario corretto. Prima di inserire il pessario, per un maggiore comfort della paziente potrebbe essere necessario un lubrificante vaginale. Il medico può suggerire K-Y jelly® o un equivalente. Il medico deve determinare se la paziente necessita di terapia estrogenica prima di prescrivere un pessario.

1. Eseguire un normale esame pelvico prima di provare e introdurre un pessario. L'esame pelvico aiuta a determinare la dimensione appropriata. Il pessario si piegherà facilmente sui fori di drenaggio più grandi per semplificare l'inserimento e la rimozione. Il pessario dovrebbe essere abbastanza grande perché sia indicato, ma non deve causare un senso di pressione o disagio inopportuno.
2. Comprimerne il pessario e inserirlo delicatamente attraverso l'introito. Quando il pessario ha superato l'introito, rilasciare il pessario compresso in modo che si espanda fino alla sua forma normale.
3. Spostare delicatamente il pessario verso la cervice per sostenere il cistocele o il rettocele e l'utero. Se è nella posizione corretta, il medico dovrebbe essere in grado di inserire un dito per lesame tra il bordo esterno del pessario e la parete vaginale. Tale margine di spazio garantirà il comfort della paziente e ridurrà il rischio di necrosi da pressione.
4. Una volta in posizione, il pessario non dovrebbe spostarsi quando si è in piedi, sedute, accovacciate o si portano pesi. Non deve risultare scomodo per la paziente durante una qualsiasi di queste attività di routine.

5. Se è la paziente a doversi occupare del pessario, assicurarsi di istruirla adeguatamente in merito alla pulizia, all'inserimento e alla rimozione.
6. Dire alla paziente di segnalare immediatamente qualsiasi disagio o difficoltà nell'urinare o defecare.


### **RIMOZIONE, PULIZIA E VISITE DI FOLLOW-UP SUGGERITE**

1. Per rimuovere il pessario, spostarlo in avanti verso l'introito con cautela. Quando il pessario è a portata di mano, comprimerlo ed estrarlo con attenzione.
2. Il pessario può essere pulito con sapone neutro e acqua calda. La durata d'uso del pessario è limitata. Esaminare il pessario per verificare che non siano presenti segni di deterioramento.
3. I rapporti sessuali sarebbero controindicati a pessario inserito.
4. Discutere con la paziente dell'importanza di seguire le istruzioni e della durata d'uso prevista del pessario.
5. Assicurarsi entro 48-24 ore che la paziente non sia allergica al pessario. Esaminare la vagina e chiedere alla paziente se ha avvertito disagio, irritazione, pressione, sensibilità o se si sono verificate perdite vaginali insolite. Determinare altresì se vi sono stati miglioramenti nei suoi sintomi personali.
6. Programmare le visite di follow-up in base alle esigenze della paziente e in conformità alle regolamentazioni locali.

### **CONDIZIONI DI GARANZIA GIMA**

Si applica la garanzia B2B standard Gima di 12 mesi.

## SIMBOLI - DESCRIZIONI

	Leggere le istruzioni per l'uso		Numero di lotto
	Fabbricante		Codice prodotto
	Data di fabbricazione		Conservare in luogo fresco ed asciutto
	Dispositivo Medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE		Conservare al riparo dalla luce solare
	Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso		Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Latex free
	Data di scadenza		Non sterile
	Dispositivo monouso, non riutilizzare		Importato da